

ART. X.—*Descriptions de Quelques Nouveaux Espèces de  
Coleoptères Australiennes.*

PAR A. GROUVELLE.

(Communicated by Arthur M. Lea).

[Read 13th July, 1911].

COLYDIIDAE.

*Ocholissa leai*, n. sp.

Oblongo-elongatus, convexus, nitidus, flavo-albida vestitus, pilis in prothoraceque longioribus, striatis, haud densatis in striis elytrorum brevissimis, lineato-positis, in intervallis, tenuioribus, brevioribusque unilineato dispositis; antennis, capite, basi apiceque antennarum pedibusque aurantiacis, prothorace et plagua transversa in elytris nigro-piceis. Antennae breves; 3<sup>o</sup> et 4<sup>o</sup> articulis, subaequalibus, subelongatis; 1<sup>o</sup> articulo clavae quam 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup> angustiore, transverso, 2<sup>o</sup> multo latiore, transverso, 3<sup>o</sup> magis quam 1<sup>o</sup> et minus quam 2<sup>o</sup> lato, transversim suboblongo. Caput transversum, convexiusculum, antice truncatum, dense punctatum, inter antennarum basim arcuatim vix impressum. Prothorax transversus, postice quam antice paulo angustus, angulis anticis rotundatis, lateribus subrectis et juxta basin sinuatus, angulis posticis obtusus, haud hebetatus, basi subarcuata, dense et capite fortius punctatus, lateribus et extremitatibus apicis basisque marginatis. Scutellum transversum. Elytra basi quam prothorax paulo latiora, humeris rotundatis, lateribus extra apicem subampliata, apice conjunctim breviter rotundata, magis duplo longiora quam simul in maxima latitudine latiora, punctato-striata; striis ad apicem impressionibus; intervallis striarum densissime tenuissimeque punctulatis, unilineato-punctatis, punctis ad apicem attenuatis; marginibus lateralibus vix plicatis. Long., 2.5 mill.



Oblong, environ trois fois plus long que large dans sa plus grande largeur, modérément convexe, brillant, couvert d'une pubescence flavo-blanchâtre, fine, couchée, assez dense sur la tête et prothorax, formée, sur les élytres, de soies très courtes inserées sur les stries et de poils encore plus courts et plus fins inserés en ligne sur les intervalles des stries, roux-orange avec le prothorax et sur les élytres avant le milieu, une large bande transversale enfumée: Antennes courtes; 3<sup>me</sup> et 4<sup>me</sup> articles des antennes subégaux, suballongés; 1<sup>er</sup> article de la massue à peine deux fois plus large que les articles précédents, moins de deux fois plus large que long, 2<sup>me</sup> presque une fois et demie plus large que le précédent, près de deux fois plus long, 3<sup>me</sup> un peu plus étroit que le précédent, légèrement transversal, subhémisphérique. Tête subtriangulaire, environ deux fois plus large que longue, modérément convexe, tronquée en avant, densément ponctuée, impressionnée de chaque côté vers la base de l'antenne, subimpressionnée transversalement entre ces bases; épistome environ deux fois plus large à la base que long, plus densément et plus finement ponctué que le front; labre petit. Prothorax en avant nettement plus large que la tête, un peu plus étroit à la base qu'au sommet, arrondi aux angles antérieurs subparallèle sur les côtés, sinués près de la base, en angle droit émoussé aux angles postérieurs, environ une fois et un tiers aussi large que long, plus densément et plus fortement ponctué que la tête, présentant sur le disque une bande lisse, longitudinale étroite; bords latéraux et extrémités de la base et du sommet rebordées. L'écusson subrectangulaire, environ deux fois plus large que long. Elytres subtronqués à la base, arrondis aux épaules alors un peu plus larges que le prothorax dans sa plus grande largeur, à peine arrondis sur les côtés plus fortement à l'extrémité brièvement arrondis ensemble au sommet, environ deux fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, ponctués-striés; stries plus marquées vers le sommet; intervalles des stries très finement et très densément pointillés, chacun avec une ligne de points plus faibles que ceux des stries, atténuée vers l'extrémité. Marges latérales à peine pliées.

Tasmanie: Hobart, 1 exemplaire envoyé par Mr. A. Lea. (Collection A. Grouvelle.)

## CUCUJIDAE.

*Laemophaeus molestus*, n. sp.

Ovatus, modice convexus, nitidus, glaber; capite prothoraceque subrufescente-nigris; elytris viridi-nigris; articulis antennarum 1-4 labro buccaque rufo-testaceis; apice antennarum infuscato; pedibus rufo-piceis. Antennae ad apicem paulatim dilatatae; 1<sup>o</sup> articulo modice incrassato, sesquolongiore quam latiore, 2<sup>o</sup>, 3<sup>o</sup> et 4<sup>o</sup> subaequalibus, 2<sup>o</sup> subincrassato, 3<sup>o</sup> et 4<sup>o</sup> gracilibus, duplo longioribus quam latioribus, 5<sup>o</sup>, 6<sup>o</sup>, 7<sup>o</sup> subelongatis, 8<sup>o</sup>, 9<sup>o</sup> et 10<sup>o</sup> subquadratis, 11<sup>o</sup> subovato, elongato, apice acuminato. Caput subtriangulare, ad oculos duplo latius quam longius, antice sat valde trisinuatum, depressum, parce punctulatum, utrinque ad antennae basin leviter impressum; lateribus juxta basin oculorum intus sinuatis, deinde rectis et convergentibus, juxta antennarum basin rotundatis; stricte marginatis; oculis modice prominulis. Prothorax antice capite paulo latior, antice parum postice paulo magis angustus, lateribus arcuatus, juxta basin sinuatus, utrinque in longitudinem unistriatus, 1 et  $\frac{1}{2}$  tam in maxima latus quam elongatus; margine antico arcuato, ad extremitates subsinuato; angulis anticis rectis, hebetatis, posticis rectis; basi subtruncata, tenuissime marginata. Elytra basi prothorace paulo latiora, humeris rotundata, lateribus arcuata, apice subseparatim rotundata; circiter 1 et  $\frac{1}{2}$  tam elongata quam simul in maxima latitudine lata, tenuissime striatis et lineato-punctatis; stria suturali ad apicem impressa, stria humeralis tenui sed indicata, subintegra; marginibus lateralibus plicatis, valde inflexis. Long., 1.5 mill.

Ovale, modérément, convexe, brillant, glabre; tête et prothorax d'un noir très légèrement rougeâtre, élytres d'un noir un peu teinté de vert bleuâtre; articles 1 à 4 des antennes, labre et bouche roux testacés; pattes roux de poix; extrémité des antennes rembrunie. Antennes progressivement et faiblement dilatées vers l'extrémité; 1<sup>er</sup> article modérément épaissi, environ une fois et demie aussi long que large, 2<sup>me</sup>, 3<sup>me</sup> et 4<sup>me</sup> subégaux, 2<sup>me</sup> un peu moins épais que le 1<sup>er</sup>, 3<sup>me</sup> et 4<sup>me</sup> grêlés, deux fois plus longs que larges, 5<sup>me</sup> à 7<sup>me</sup> sub-

allongés, 8<sup>me</sup> à 10<sup>me</sup> subcarrés, 11<sup>me</sup> subovale, acuminé à l'extrémité, environ une fois et demie aussi long que large. Tête triangulaire, environ deux fois plus large au niveau des yeux que longue, trisinuée au bord antérieur, subdéprimée, éparsément pointillée, impressionnée de chaque côté vers la naissance de l'antenne; bords latéraux sinués en dedans à la base de l'oeil, puis droits, convergents, arrondis à la base de l'antenne finement rebordés; yeux médiocrement saillants, laissant libre entre eux et la base de l'antenne une distance égale environ à leur diamètre longitudinal. Prothorax subcordiforme, médiocrement rétréci au sommet, un peu plus à la base, environ une fois et demie aussi large dans sa plus grande largeur que long; éparsément pointillé, longitudinalement strié de chaque côté; bord-antérieur arqué faiblement sinué aux extrémités; angles antérieurs droits émoussés; étroitement impressionnés; côtés très finement rebordés, arqués, sinués près de la base, déterminant la plus grande largeur du prothorax vers les  $\frac{3}{5}$  de la longueur à partir de la base; angles postérieurs droits, non émoussés, base subtronqué, très finement rebordée. Ecusson triangulaire, transversal, presque égal au tiers de la largeur du prothorax à la base. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base, arrondis aux épaules, arqués sur les côtés assez élargis, arrondis presque séparément au sommet, environ une fois et demie aussi longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, à peine visiblement striés et ponctués en lignes; stries suturales marquées vers le sommet; stries humérales, indiquées, presque entières; marges latérales fortement inclinées, pliées. Cavités des hanches antérieurs étroitement formées, celles-ci écartées, suture latérale partant des hanches antérieures marquées, n'atteignant pas le bord latéral. Hanches intermédiaires très écartées. Mesosternum et metasternum à peine pointillés, le 1<sup>er</sup> plan, le 2<sup>me</sup> longitudinalement strié dans la moitié apicale. Premier segment de l'abdomen moins de deux fois plus court que le metasternum, très largement subtronqué entre les hanches postérieures.

Australie; Queensland, Cairns, 1 exemplaire envoyé par Mr. A. Lea. (Collection A. Grouvelle.)

**Laemophlaeus subpallidus, n. sp.**

Elongatus, subparallelus, subdepressus, nitidulus, tenue flavo-pubescent, testaceus; antennis, capite prothoraceque rufo-testaceis. Antennae subbreves, clava triarticulata; 1<sup>o</sup> articulo incrassato, parum elongato, 2<sup>o</sup> subincrassato, sub elongato, 3<sup>o</sup>—8<sup>o</sup> gracilibus, plus minusve subquadratis vel subtransversis; clava elongata, parum incrassata articulis subaequalibus, sat elongatis. Caput subtriangulare, transversum, antice truncatum, depressum, parce punctulatum, utrinque ad antennae basin impressum; lateribus ad oculis basin sinuatis, deinde rectis, convergentibus, ad antennae insertionem sinuatis, tenuissimè marginatis; labro magno; oculis parum prominulis. Prothorax antice quam capite tam latus, vix angustus, basin versus angustior, lateribus bisinuatus, tam elongatus quam in maxima latitudine latus, utrinque in longitudinem unistriatus; disco medio, in longitudinem excepto, subdense punctulato; angulis posticis rectis, haud hebetatis. Scutellum subpentagonale, transversissimum. Elytra basi truncata, humeris late rotundata, tenuiter denticulata, prothorace in maxima latitudine paulo latiora, lateribus parum arcuata, modicissime ampliata, apice conjunctim rotundata, 2 et  $\frac{1}{2}$  tam elongata, quam simul in maxima latitudine lata; singulo elytro tenuiter striato, intervallis striarum unilineato punctulatis; marginibus lateralibus plicatis. Long., 1.5 mill.

Subparallèle, plus de trois fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur, subdéprimé, un peu brillant, très finement et peu densément pubescent, testacé, antennes, tête et prothorax roux testacés. Antennes assez courtes, à massue peu marquée de trois articles lâches; 1er article épais, un peu allongé, 2<sup>me</sup> un peu moins épais, suballongé, 3<sup>me</sup> à 8<sup>me</sup> grêlés, plus ou moins subcarrés ou subtransversaux; massue allongée, formée de trois articles subégaux, environ une fois et un tiers aussi longs que larges. Tête subtriangulaire, presque deux fois plus large au niveau des yeux que longue, tronquée en avant, presque déprimée, éparsément pointillée, impressionnée de chaque côté vers la naissance de l'antenne, substriée-impressionnée entre ces bases; bords latéraux sinués à la base des yeux, puis droits, convergents, sinués à la base de l'antenne, très finement rebordés; épistome plus de trois fois

plus large à la base que long; labre environ deux fois plus large à la base que long, tronqué au bord antérieur; yeux médiocrement saillants, séparés de l'insertion de l'antenne par une distance à peu près égale au diamètre longitudinale de l'oeil. Prothorax en avant à peu près de la largeur de la tête, à peine rétréci au sommet, plus fortement à la base, bisinué sur les côtés, présentant sa plus grande largeur un peu avant le sommet, environ aussi long que large dans sa plus grande largeur, longitudinalement strié de chaque côté, assez densément pointillé sur les côtés du disque, présentant sur le milieu une étroite bande lisse, séparant deux vagues impressions longitudinales; espace entre les côtés et les striés latérales densément ponctué; côtés très finement rebordés; angles postérieurs droits, non saillants; base arquée, sinuée aux extrémités. Ecusson subpentagonal, plus de deux fois plus large que long, égal dans sa plus grande largeur environ au tiers de la largeur du prothorax à la base. Elytres tronqués à la base, assez largement arrondis aux épaules, subdentés, alors un peu plus larges que le prothorax dans sa plus grande largeur, très faiblement arqués sur les côtés sauf au sommet, arrondis ensemble au sommet, environ deux fois et demie aussi longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, chacun avec trois fines stries sur le disque, séparées par une ligne pointillée; marges latérales pliées, fortement infléchies. Cavités des hanches antérieures ouvertes, celles-ci écartées. Hanches intermédiaires un peu plus écartées. Mesosternum infléchi en avant. Metasternum sans strie longitudinale, subtronqué entre les hanches postérieures; celles-ci écartées comme les hanches intermédiaires.

Australie: Nouvelle Galles du Sud, Forest Reefs, 3 exemplaires envoyés par Mr. A. Lea.

Cette description est faite sur un exemplaire male; chez la femelle les antennes sont plus courtes, la tête est moins large, et le prothorax relativement moins développé en avant.

Voisin de *L. pallidus*, Lea, différent par sa forme plus large, son prothorax convexe, et ses antennes plus longues (ex auct.).

### **Laemophlaeus mendax**, n. sp.

Oblongo-elongatissimus, subdepressus, nitidulus, tenue pubescens, fusco-testaceus; capite prothoraceque subrufescen-

tibus; antennis pedibusque testaceis. Antennae breves, clavae triarticulatae; articulis 1.2 sat valde incrassatis, subquadratis, 3<sup>o</sup>-8<sup>o</sup> gracilibus, 3<sup>o</sup> subquadrato, aliis plus minusve transversis; 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup> articulo clavae transversis, 3 subhemispherico. Caput triangulare, fere tam elongatum quam latum, antice truncatum, sat convexum, inter antennarum bases et in longitudinem frontis subvalde striatum, subdense et subvalde punctatum; lateribus juxta oculos sinuatis, antice rectis et convergentibus, ad basin antennarum sinuatis, strictissime elevato-marginatis; oculis prominulis. Prothorax suboblongus, antice quam postice vix angustus, lateribus subparallelus, angulis oblique subarcuato-truncatus, subelongatus, utrinque in longitudinem unistriatus; disco depresso in longitudinem leviter biimpresso et valde punctatus, spatio inter impressiones subelevato laevi, lateribus praecipue ad basin subtilissime crenulatis. Scutellum transversum, subpentagonale. Elytra basi sinuata, humeris breviter rotundata, subdentata, prothorace parum latiora, lateribus modice arcuata, apice conjunctim rotundata, fere 2 et 1/3 tam elongata quam simul in maxima latitudine lata, in disco subvalde praecipue ad apicem tristriata; intervallis striarum ad basin unilineato-punctata; marginibus lateralibus plicatis. Long., 1.6 mill.

Oblong, presque quatre fois plus long que large dans sa plus grande largeur, subdéprimé, un peu brillant, très finement et peu densément pubescent, testacé, légèrement enfumé; tête et prothorax un peu teintés rougeâtre; antennes et pattes testacées. Antennes courtes, à massue de trois articles; 1er et 2me article de l'antenne, surtout le 1er, épaissis, tous deux subcarrés, articles 3 à 8 grêlés, les premiers subcarrés, les suivants devenant progressivement plus transversaux; massue légèrement dissymétrique, les deux premiers articles transversaux, le 3me subhémisphérique. Tête triangulaire, presque aussi longue que large au niveau des yeux, tronquée au bord antérieur, assez convexe, fortement et densément ponctuée, fortement striée entre les bases des antennes, longitudinalement et assez fortement striée sur le front; épistome transversal, finement ponctué; labre visible; bords latéraux échancrés par les yeux, puis droits, convergents, sinués à la naissance de l'antenne, finement rebordés; yeux saillants, séparés de la base de l'antenne par une distance subégale à leur

diamètre longitudinal. Prothorax suboblong, un peu plus large dans sa plus grande largeur que la tête, à peine rétréci en avant, largement arrondi aux angles, presque obliquement tronqué, faiblement arrondi sur les côtés, presque parallèle, un peu plus long que large, longitudinalement strié de chaque côté; disque déprimé densément et fortement ponctué, marqué de deux impressions longitudinales, superficielles, mieux marquées aux extrémités séparées par un espace longitudinal, étroit, espaces entre les côtés et les stries longitudinales plus finement et plus éparsément ponctués; côtés finement rebordés, à peine visiblement crénelés dans la partie basilaire; base impressionnée de chaque côté vers les extrémités, celles-ci très finement denticulées. Ecusson subpentagonal, transversal, égale environ au quart de la longueur de la base du prothorax. Elytres subsinués à la base, arrondis aux épaules, subdentés, alors un peu plus larges que le prothorax dans sa plus grande largeur, modérément arrondis sur les côtés, plus fortement vers l'extrémité, présentant leur plus grande largeur vers le milieu de la longueur, ensemble au sommet, environ deux fois et un tiers aussi longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, chacun avec trois stries bien marginées, surtout vers le sommet; intervalles des stries ponctués en ligne dans la région basilaire; marges latérales pliées, fortement infléchies. Cavités des hanches antérieures ouvertes, celles-ci un peu écartées. Hanches intermédiaires assez écartées. Mesosternum plan. Metasternum sillonné vers le sommet. Premier segment de l'abdomen plus de deux fois plus court que le metasternum, saillant en angle arrondi entre les hanches postérieures; celles-ci moins écartées que les hanches intermédiaires.

Australie; Nouvelle Galles du Sud, Jenolan, 1 exemplaire envoyé par Mr. A. Lea. (Collection A. Grouvelle.)

### **Laemophlaeus inauditus, n. sp.**

Oblongo-elongatissimus, subdepressus, nitidulus, tenue pubescens, ruffo-testaceus, elytris parum infuscatis. Antennae breves, clavae triarticulatae; articulis 1.2 sat valde incrassatis, 1<sup>o</sup> parum elongato, 2<sup>o</sup> subquadrato, 3<sup>o</sup>-8<sup>o</sup> gracilibus, submoniliformibus; clavae 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup> articulo transversis, 3<sup>o</sup> subhemi-



spherico. Caput triangulare, tam elongatum quam latum, antice truncatum, modice convexiusculum, inter antennarum bases sat valde subarcuatim striatum; fronte dense punctulata, in longitudinem breviter striata, lateribus rectis, convergentibus, strictissime elevato-marginatis; oculis leviter prominulis. Prothorax suboblongus antice quam postice paulo latior, subelongatus, subdense punctulatus, utrinque in longitudinem unistriatus, in disco depressus, antice posticeque transversim subimpressus; angulis anticis posticisque sat late rotundatis. Scutellum transversum, subpentagonale. Elytra basi truncata, humeris rotundata, prothorace vix latiora, lateribus parum arcuata, apice conjunctim late rotundata, circiter 2 et  $\frac{1}{2}$  tam elongata quam in maxima latitudine lata, in disco tristriata; striis ad apicem impressionibus, intervallis striarum unilineato-punctatis; marginibus lateralibus plicatis, valde inflexis. Long., 1.5-1.8 mill.

Oblong, environ quatre fois plus long que large dans sa plus grande largeur, subdéprimé, un peu brillant, très finement et peu densément pubescent, roux testacé avec les élytres légèrement rembrunis. Antennes courtes, à massue de trois articles; 1er et 2me articles également épais, 3me à 8me grêlés, 9me à 11me formant une massue lâche, un peu plus épaisse que les 2 premiers articles; 1er article un peu allongé, 2me subcarré, 3me à 8me plus ou moins subtransversaux, articles 1 et 2 de la massue transversaux, 3me subhémisphérique. Tête triangulaire, sensiblement aussi longue que large avec les yeux, subtronquée en avant, subconvexe, densément pointillée et longitudinalement striolée sur le front, assez fortement striée entre les naissances des antennes, épistome presque lisse, bords latéraux de la tête droit, non échancrés par les yeux, très finement relevés rebordés; yeux à peine saillants, occupant les deux tiers de la distance de la base de la tête à la naissance de l'antenne. Prothorax suboblong, un peu rétréci à la base, un peu plus large dans sa plus grande largeur que la tête, un peu allongé, largement arrondi aux angles antérieurs et postérieurs, longitudinalement strié de chaque côté, assez densément ponctué, déprimé sur le disque, presque creusé d'une large impression longitudinale, plus accentuée aux extrémités; marge basilaire impressionnés de chaque côté vers les extrémités. Ecusson transversal, subpenta-

gonal. Elytres de la largeur du prothorax à la base, arrondis aux épaules, faiblement arqués sur les côtés, plus fortement vers l'extrémité, très faiblement élargis, largement arrondis ensemble au sommet, environ deux fois et demie aussi longs que larges ensemble dans leur grande largeur, chacun avec trois stries plus accentuées à l'extrémité, séparées par une ligne de points; pli huméral marqué; marge latérale fortement inclinée. Cavité des hanches antérieures ouvertes, celles-ci très rapprochées. Hanches intermédiaires assez éloignées. Mesosternum plan. Metasternum longitudinalement sillonné sauf à la base. Premier segment de l'abdomen plus de trois fois plus court que le metasternum, saillant en angle aigu émoussé entre les hanches postérieures. Dernier segment de l'abdomen du male creusé d'une forte impression déterminant de chaque côté un lobe arrondi, convexe.

Tasmanie: Frankford, 4 exemplaires envoyés par Mr. A. Lea. (Collection A. Grouvelle.)

#### *Laemophlaeus frater*, n. sp.

Elongatus, subparallelus, subdepressus, tenue flavo pubescens, testaceus, antennis, capite prothoraceque rufo-testaceis. Antennae elongatae, clavae triarticulatae; 1<sup>o</sup> articulo modice incrassato, apud marem sesquialongiore quam latiore, 2<sup>o</sup> subincrassato, praecedente paulo brevior, 3<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup>, 6<sup>o</sup> et 8<sup>o</sup> gracilioribus, subaequalibus, quam 2 paulo latiore, 5<sup>o</sup> et 7<sup>o</sup> subaequalibus quam aliis oblongioribus; clava elongata, praecedentibus paulo latioribus, articulis subaequalibus, modice elongatis. Caput subtriangulare, transversum, antice truncatum, convexiusculum, parce punctulatum, utrinque ad antennae basin impressum; lateribus ad oculi basin sinuatis, deinde rectis, convergentibus, ad antennae insertionem sinuatis, tenuissime marginatis; labro magno; oculis parum prominulis. Prothorax basin versus angustus, lateribus bisinuatus, tenuissime marginatus, 1 et  $\frac{1}{4}$  tam in maxima latitudine latus quam elongatus, utrinque in longitudinem striatus; disco bi-subfoveolato, parce punctulato, basi arcuata, ad extremitates subsinuata; angulis posticis rectis, haud hebetatis. Scutellum subpentagonale, transversissimum. Elytra basi truncata, prothorace latiora, humeris rotundata, lateribus parum arcuata, modicissime ampliata, apice separatim latissime rotundata, paulo magis duplo longioribus quam

simul in maxima latitudine latiora; singulo elytro tenuiter tris-triato, intervallis striarum unilineato-punctulatis; marginibus lateralibus carinatis. Long., 1.4 mill.

Subparallèle, plus de 3 fois  $\frac{1}{2}$  aussi long que large dans sa plus grande largeur, subdéprimé, très finement et peu densément pubescent, testacé; antennes, tête et prothorax testacés-rougeâtres. Antennes allongées à massue peu marquée de trois articles lâches; 1er article épaissi, environ une fois et demie aussi long que large chez le male, 2me un peu épaissi, un peu plus courts que le précédent les suivants plus grêlés, le 3me, le 4me, le 6me et le 8me subégaux, un peu plus courts que le 2me, le 5me et le 7me subégaux, un peu plus longs que les précédents; massue allongée, formée de trois articles subégaux, nettement plus longs que larges. Tête triangulaire, presque aussi longue que large au niveau des yeux, tronquée en avant, faiblement convexe, éparsément pointillée, à peine visiblement striée entre les bases des antennes; bords latéraux sinués à la base des yeux, puis droits, convergents, sinués à la base des antennes, très finement rebordés; épistome plus de deux fois plus large à la base que long, labre environ deux fois plus large à la base que long, subsinué au bord antérieur; yeux médiocrement saillants, séparés de l'insertion de l'antenne par une distance à peu près égale à la moitié de leur diamètre longitudinal. Prothorax en avant à peu près de la largeur de la tête, rétréci à la base, bisinué sur les côtés, présentant sa plus grande largeur au delà du deuxième tiers de la longueur à partir de la base, environ une fois et un quart aussi large dans sa plus grande largeur que long, longitudinalement strié de chaque côté, éparsément pointillé sur le disque et biimpressionné; côtés, très finement rebordés; angles postérieurs droits, non émoussés; base arquée, sinuée aux extrémités. Ecusson subpentagonal, plus de deux fois plus large que long, égal au tiers de la largeur du prothorax à la base. Elytres subsinués à la base, un peu plus larges que le prothorax, arrondis aux épaules, très faiblement arqués sur les côtés, sauf au sommet, à peine élargis, très largement arrondis séparément au sommet, un peu plus de deux fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, chacun avec trois fines stries sur le disque; intervalles des stries avec un ligne de petits points; marges latérales carénées, fortement inflé-

chies. Cavités des hanches antérieures ouvertes; celles-ci écartées. Hanches intermédiaires un peu plus écartées. Mesosternum infléchi en avant. Metasternum sans strie longitudinale, subtronqué entre les hanches postérieures, celles-ci écartées comme les hanches intermédiaires.

Australie: Nouvelle Galles du Sud, Richmond R., 4 exemplaires envoyés par Mr. A. Lea. (Collection A. Grouvelle.)

Cette description est faite sur un exemplaire male; la femelle a les antennes plus courtes, la tête moins large, le prothorax également moins large en avant et par suite paraissant moins rétréci à la base.

### *Silvanus crenicollis*, n. sp.

Ovatus, convexus, nitidulus, pube flava, brevissima, in elytris lineato-disposita vestitus, brunneo-testaceus; antennis capite prothoraceque subrufescentibus. Antennae breves, subgraciles; clava triarticulata; 1<sup>o</sup> articulo incrassato parum elongato, 2<sup>o</sup> subquadrato, fere tam incrassato, 3<sup>o</sup> sesquilongiore quam latiore, vix incrassato, 4<sup>o</sup> subquadratis, 5<sup>o</sup>-8<sup>o</sup> plus minusve modice transversis, 2<sup>o</sup> articulo clavae quam 1<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup> paulo latiore, 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup> transversis, 3<sup>o</sup> subovato, subtransverso. Caput transversum, fronte subdepressum, antice inflexum, crebre punctatum, lateribus strictissime elevato-marginatum; oculis prominulis, granis haud minimis; temporibus nullis. Prothorax antice quam capite haud latior, antice parum, postice paulo magis angustus, lateribus modice arcuatus, 1 et 1/5 in maxima latitudine tam latus quam elongatus, crebre et fortius capite punctatus; margine antico arcuato, angulis anticis obtusis, vix dentatis; lateribus inter angulos anticos et posticos sex denticulos latos et vix productis armatis; angulis posticis obtusis, vix dentatis; basi arcuata, utrinque subsinuata. Elytra basi prothorace haud latiora, humeris rotundata, lateribus arcuata, modice ampliata, apice conjunctim rotundata, fere duplo longiora quam simul in maxima latitudine latiora, striato-punctata; striis apicem versus attenuatis, ad latera magis impressis; intervallis striarum quam punctis haud latioribus; stria marginalis impressis, intervallo marginalis unilineato-punctata. Long., 1.5 mill.

Ovale, environ deux fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur, convexe, un peu brillant, couvert d'une

pubescence, flave un peu dorée, modérément fine, très courte, éparse sur la tête et le prothorax, inclinée et disposée en ligne sur les stries des élytres et leurs intervalles, d'un brun testacé avec les antennes, la tête et le prothorax légèrement teintés de rougeâtre. Antennes grêlés, terminées par une massue de trois articles séparés; 1er article épais, un peu allongé, 2me presque aussi épais que le 1er, suballongé. 3me subégal au précédent, mais sensiblement moins épaissi, 4me à 8me articles subcarrés ou subtransversaux; 2me article de la massue plus large que le 1er et le 2me, 1er et 2me transversaux, 3me ovale, environ aussi long que large. Tête triangulaire, presque deux fois aussi large que longue, subdéprimée sur le front, infléchie en avant, couverte d'une ponctuation très serrée, plus ou moins confluyente, subrugueuse, presque effacée sur l'épistome, très finement et assez fortement rebordée, relevée sur les côtés; labre très petit; saillie des yeux assez forte, mais inférieure à leur diamètre longitudinal, granulations moyennes; tempes nulles. Prothorax aussi large en avant que la tête au niveau des yeux, un peu moins large à la base qu'au sommet, faiblement arrondi sur les côtés, environ une fois et un cinquième aussi large dans sa plus grande largeur que long, couvert d'une ponctuation très serrée, un peu plus forte que celle de la tête, plus ou moins confluyente; bord antérieur arqué, subsinué aux extrémités; angles antérieurs obtus, armés d'une dent assez large et courte; côtés armés en comprenant les denticules des angles antérieurs et postérieurs, de six denticules larges, plus courts que larges à la base, irrégulièrement espacés; angles postérieurs obtus, dentés comme les angles antérieurs; base arquée, subsinuée de chaque côté. Ecusson très transversal, subrectangulaire, presque égal au tiers de la largeur du prothorax à la base. Elytres légèrement convexes sur le disque, subsinués à la base, assez brièvement arrondis aux épaules, très modérément arrondis sur les côtés dans la partie basilaire, présentant leur plus grande largeur au delà du 2me tiers de la longueur à partir de la base, arrondis ensemble au sommet, presque deux fois aussi longs que larges dans leur plus grande largeur, ponctués-striés; stries atténuées vers le sommet; intervalles discoidaux des stries sensiblement aussi larges que les points, plans; strie marginale enfoncée, plus fortement ponctuée, intervalle mar-

ginal assez large, avec une ligne de points, 1er intervalle latéral convexe, plus large que les points de la strie marginale; stries suturales entières. Prosternum subrugueux sur le disque, éparsément ponctué sur les côtés en avant du sillon latéral des hanches antérieurs; celles-ci médiocrement marqués n'atteignant pas le bord latéral; bord antérieur bordé par un courselet; metasternum longitudinalement sillonné, à peine à la base plus fortement au sommet, presque lisse sur le disque, ponctué vers les angles postérieurs; 1er segment de l'abdomen beaucoup plus court que le metasternum, saillant en angle obtus entre les hanches postérieures, peu densément pointillé. Hanches intermédiaires écartées.

Australie: Cairns, 2 exemplaires envoyés par Mr. A. Lea. (Collection A. Grouvelle.)

### *Silvanus peculiaris*, n. sp.

Elongatissimus, subparallelus, modice convexus, nitidulus, pube flava brevissima, sparsa in capite prothoraceque, lineatoposita in elytris, vestitus, nigro-brunneus, antennis pedibusque rufo piceis. Antennae breves, subincrassatae, 1<sup>o</sup> articulo incrassato, subquadrato, 2<sup>o</sup> paulo minus incrassato, subtransverso, 3<sup>o</sup> paulo incrassato, subelongato, 4<sup>o</sup>-8<sup>o</sup> paulatim transversioribus; clava triarticulata, articulis densatis, 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup> transversis, 3<sup>o</sup> praecedentibus angustiore, transversim suboblongo, apice acuminato. Caput subparallelum, elongatum, antice rotundatum, depressum, dense subrugoso-punctatum, lateribus juxta oculos strictissime elevato-marginatis, oculis parum prominulis; temporibus minimis, angulosis. Prothorax antice quam caput paulo latior, basin versus vix angustus, 1 et  $\frac{1}{4}$  tam elongatus quam latus, disco depresso, dense subrugoseque punctatus; margine antico arcuato, utrinque sinuato; angulis anticis denticulo hebetato, extus producto, armatis; lateribus inter angulos anticos et posticos quatre dentius latis, haud elongatis, hebetatis armatis; angulis posticis dentatis; basi valde arcuata, extus sinuata. Elytra ad basin prothorace paulo latiora, oblongo-elongata, apice subseparatim rotundata, magis ter longiora quam simul in maxima latitudine latiora, tenuiter punctato-lineata, intervallis alternis praecipue ad basin, ad latera et ad apicem subelevatis; intervallis humerali-

bus plicatis, subcarinatis; marginibus lateralibus inflexis, lateribus tenuiter marginatis, vix perspicue crenulatis. Caput subtus inter oculos angustior. Long., 3.5 mill.

En ovale très allongé, subparallèle, environ plus de cinq fois plus long que large dans sa plus grande largeur, modérément convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence flave très courte, rare sur la tête et le prothorax, inclinée et disposée en lignes sur les stries des élytres et leurs intervalles, d'un brun foncé avec les antennes et les pattes un peu rougeâtres. Antennes insérées notablement en avant des yeux, 1er article épais, subcarré, 2me un peu moins épais, subtransverse, 3me faiblement épaissi, suballongé, 4me à 8me d'abord subcarrés puis devenant progressivement transversaux; massue formée de trois articles brusquement plus larges que les précédents; 1er article transversal, 2me un peu plus large que le 1er, à peine plus court, 3me plus étroit que les deux premiers, à peine aussi long que large, suboblong, acuminé à l'extrémité. Tête subparallèle, atténuée, arrondi en avant, environ une fois et un quart aussi longue que large, déprimée sur le front, légèrement infléchie en avant, couverte d'une ponctuation serrée, subrugueux, s'atteignant notablement sur l'épistome, très étroitement et faiblement relevée contre les yeux; yeux peu saillants, granulations fines; tempes petites anguleuses. Prothorax un peu plus large que la tête en avant, à peine rétréci à la base, à peine arqué sur les côtés, environ une fois et un quart aussi long que large, largement déprimé sur le disque avec un vestige de caréné longitudinal, couvert d'une ponctuation plus forte que celle de la tête, très serrée, subrugueuse; bord antérieur fortement arqué, sinué aux extrémités; angles antérieurs, armés d'une dente un peu émoussée, saillants latéralement; côtés armés entre les dents des angles antérieurs et postérieurs de 4 dents larges, peu saillants émoussées; dents des angles postérieurs triangulaires, non émoussées; base très fortement arquée dans le milieu, sinuée aux extrémités. Ecusson très transversal, subrectangulaire, aussi, large environ que le cinquième de la largeur du prothorax à la base. Elytres sinués à la base, arrondis aux épaules, en ovale très-allongés, un peu plus larges que le prothorax, presque arrondis, séparément à l'extrémité, environ trois fois et un tiers aussi longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, finement ponc-

tués en lignes, substriés; intervalles alternés des lignes ponctuées subélevés surtout à la base; sur les côtés et vers le sommet; intervalle humeral plié, subcaréné; marges latérales fortement déclinées, finement rebordées, à peine visiblement crénelées. Yeux n'échancrant pas en dessous les marges latérales de la tête. Prosternum couvert sur les côtés de points serrés, superficiels, ocellés; bord antérieur bordé par un coursetlet; metasternum assez densément ponctué longitudinalement sillonné sauf à la base; 1er segment de l'abdomen beaucoup plus court que le metasternum, saillant en angle aigu entre les hanches postérieures, presque lisse au milieu, ponctué sur les côtés, présentant des stries femorales courtes, subparallèles. Hanches intermédiaires séparées.

Australie: Victoria, Birchip, 1 exemplaire envoyé par Mr. A. Lea. (Collection A. Grouvelle.)

## EROTYLIDAE.

### XENOSCELINI.

#### *Xenoscelinus tasmanicus*, n. sp.

Oblongus modice convexus, pube flavo-grisea subdense vestitus; castaneo-testaceus; capite prothoraceque piceis. Antennae breves, clavae biarticulatae; 1<sup>o</sup> articulo transverso; ultimo glandiforme. Caput convexiusculum, dense punctulatum; granis oculorum mediocribus. Prothorax magis duplo latior quam longior, angulis anticis subrotundatus, lateribus bisinuatus, angulis posticis rectus, haud hebetatus; lateribus tenuiter marginatis; basi subtruncata et ad apicem subsinuata. Elytra prothorace ad basin paulo latiora, humeris angulosa, lateribus extra apicem parum arcuata, apice conjunctim rotundata, 1 et 2/3 tam elongata quam simul in maxima latitudine lata; subtenuiter striato-punctata; striis ad apicem et ad latera attenuatis. Long., 2 mill.

Oblong, environ deux fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur, modérément convexe, brillant, couvert d'une pubescence flave-cendrée, fine, couchie et assez dense; brun de poix sur la tête et le prothorax, marron-testacé sur les élytres; bouche, pattes, et antennes plus claires. Antennes courtes, terminées par une massue de deux articles dont le



premier est plus de deux fois plus large que long et dont le dernier, un peu plus long que large, est en forme de gland. Tête plus de deux fois plus large que longue, convexe, densément pointillée. Prothorax plus de deux fois plus large que long, arqué en avant, arrondi aux angles antérieurs, bisinué sur les côtés et finement rebordé, ou angles droits non émoussés aux angles postérieurs, subtronqué à la base, très finement rebordé aux extrémités, de celle-ci aussi densément, mais plus fortement ponctué que la tête. Elytres tronqués à la base, un peu plus larges que le prothorax, en angle non émoussés aux épaules, faiblement arquées sur les côtés, sauf vers l'extrémité très faiblement élargés, arrondis ensemble au sommet, environ une fois et deux tiers aussi longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, finement ponctués-striés; stries atténuées sur les côtés et à l'extrémité; intervalles des stries plans, finement pointillés. Stries marginales, des hanches intermédiaires s'écartant de la hanche pour rejoindre le bord interne de l'épimère metathoracique. Stries marginales des hanches postérieures s'avancant en angle obtus presque au milieu du segment; branche interne de l'angle prolongée presque jusqu'au sommet du segment. Portrine et abdomen finement alutacés.

Australie: Nouvelle Galles du Sud, Richmond River, 3 exemplaires envoyés par Mr. A. Lea.